

AZILECT

Mis à jour : Mardi 18 Septembre 2018

Famille du médicament :

Antiparkinsonien

Dernières actualités :

- 23/03/2017 : Conduite automobile : actualisation de la liste des médicaments à risque de somnolence

Dans quel cas le médicament AZILECT est-il prescrit ?

Ce médicament est un antiparkinsonien qui appartient à la famille des IMAO sélectifs B. Il augmente les taux de dopamine en bloquant sa dégradation dans le cerveau. Il permet ainsi d'améliorer certains symptômes observés au cours de la maladie de Parkinson, comme la raideur musculaire et la lenteur des mouvements.

Il est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson, seul ou en association avec les médicaments contenant de la lévodopa (**MODOPAR, SINEMET...**) dont il renforce l'action.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- Maladie de Parkinson

Présentations du médicament AZILECT

AZILECT 1 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 30
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 65 % - **Prix : 62,44 €.**

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

Composition du médicament AZILECT

	p cp
Rasagiline	1 mg

Substances actives : Rasagiline, Rasagiline mésilate

Excipients : Acide stéarique, Amidon de maïs, Amidon de maïs modifié, Mannitol, Silice colloïdale anhydre, Talc

Contre-indications du médicament AZILECT


Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- insuffisance hépatique grave,
- en association avec un autre IMAO ou un médicament contenant de la péthidine.

Attention

Les antiparkinsoniens dopaminergiques exposent à un risque de troubles compulsifs du comportement : jeu pathologique, dépenses inappropriées et répétées, boulimie, augmentation importante de la libido. De tels troubles ont également été observés avec ce médicament. Signalez rapidement à votre médecin d'éventuels changements de comportement. Il pourra être amené à modifier votre traitement.

Des études suggèrent que la maladie de Parkinson est associée à un risque accru de cancer de la peau. Un examen régulier de votre peau par votre médecin et vous-même est nécessaire afin d'y déceler des signes suspects (par exemple un grain de beauté ayant une bordure irrégulière ou une couleur qui change).

 La rasagiline peut provoquer une somnolence pendant la journée et un endormissement au cours des activités quotidiennes, en particulier si vous prenez d'autres médicaments dopaminergiques. La conduite automobile et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées pendant le traitement. Elles sont contre-indiquées chez les personnes ayant eu une envie impérieuse de dormir sous traitement.