

L'information médicale grand public de référence

Asthme, aspirine, amoxicilline...

Rechercher

Historique

Familles &
Rhumatismes

Médicaments

Parapharmacie

Maladies

Grossesse
& EnfantsConseils
au quotidien

Actualités

Accueil > Médicaments > AZILECT

AZILECT

Mis à jour : Lundi 17 Décembre 2018

1.9K



Famille du médicament :

Antiparkinsonien

Dernières actualités :

- 23/03/2017 : Conduite automobile : actualisation de la liste des médicaments à risque de somnolence

Dans quel cas le médicament AZILECT est-il prescrit ?

Ce médicament est un antiparkinsonien qui appartient à la famille des **IMAO** sélectifs B. Il augmente les taux de **dopamine** en bloquant sa dégradation dans le cerveau. Il permet ainsi d'améliorer certains symptômes observés au cours de la maladie de **Parkinson**, comme la raideur musculaire et la lenteur des mouvements.

Il est utilisé dans le traitement de la maladie de **Parkinson**, seul ou en association avec les médicaments contenant de la lévodopa (**MODOPAR**, **SINEMET**...) dont il renforce l'action.

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants :

- [Maladie de Parkinson](#)

Présentations du médicament AZILECT

AZILECT 1 mg : comprimé (blanc) ; boîte de 30
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 65 % - Prix : 40,90 €.

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « [honoraires de dispensation](#) » du pharmacien.

Composition du médicament AZILECT

	p cp
Rasagiline	1 mg

Substances actives : **Rasagiline**, **Rasagiline mésilate**

Excipients : Acide stéarique, Amidon de maïs, Amidon de maïs modifié, **Mannitol**, Silice colloïdale anhydre, Talc

Contre-indications du médicament AZILECT

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- **insuffisance hépatique** grave,
- en association avec un autre **IMAO** ou un médicament contenant de la **péthidine**.

Attention

Les antiparkinsoniens dopaminergiques exposent à un risque de troubles compulsifs du comportement : jeu pathologique, dépenses inappropriées et répétées, **boulimie**, augmentation importante de la libido. De tels troubles ont également été observés avec ce médicament. Signalez rapidement à votre médecin d'éventuels changements de comportement. Il pourra être amené à modifier votre traitement.



Tout savoir sur
les compléments
alimentaires

Actualités



Effets indésirables psychiatriques et sexuels du finastéride : rappel des risques et de la conduite à tenir



Carbimazole et thiamazole (synonyme méthimazole) : risque de pancréatite aiguë et renforcement des recommandations sur la contraception



Répertoire des génériques : 19 nouveaux groupes

Recevez la
newsletter



> je m'abonne

Infos +

- Prescription en substance active (DC) >
- Plans de Gestion des Risques : la surveillance des médicaments >

Fiche professionnelle

- AZILECT 1 mg cp >

Des études suggèrent que la maladie de Parkinson est associée à un risque accru de cancer de la peau. Un examen régulier de votre peau par votre médecin et vous-même est nécessaire afin d'y déceler des signes suspects (par exemple un grain de beauté ayant une bordure irrégulière ou une couleur qui change).



La rasagiline peut provoquer une somnolence pendant la journée et un endormissement au cours des activités quotidiennes, en particulier si vous prenez d'autres médicaments dopaminergiques. La conduite automobile et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées pendant le traitement. Elles sont contre-indiquées chez les personnes ayant eu une envie impérieuse de dormir sous traitement.

Interactions du médicament AZILECT avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé avec les autres IMAO, les antalgiques contenant de la péthidine et les produits de phytothérapie contenant du millepertuis : il convient de respecter un délai d'au moins 14 jours entre l'arrêt de la rasagiline et le début d'un traitement avec l'un de ces médicaments.

Il peut interagir avec les vasoconstricteurs décongestionnants utilisés dans le traitement du rhume (par voie orale ou nasale) et les médicaments contenant du dextrométhorphan, de la fluvoxamine, de la flouxétine ou de la ciprofloxacine.

Lors de l'arrêt du tabagisme, l'effet de ce médicament peut être renforcé ; informez votre médecin ou votre pharmacien si vous fumez ou si vous avez l'intention d'arrêter de fumer.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

Allaitement :

Ce médicament peut inhiber la lactation.

Mode d'emploi et posologie du médicament AZILECT

Ce médicament peut être pris au cours ou en dehors des repas.

Posologie usuelle :

_ Adulte de plus de 18 ans : 1 comprimé par jour.

Conseils

Prenez contact avec les associations destinées aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson : elles diffusent une information utile sur l'évolution de la maladie et sur ses traitements.

Le maintien d'une activité physique régulière est recommandé.

Effets indésirables possibles du médicament AZILECT

Très fréquents (plus de 10 % des patients) : mouvements anormaux, maux de tête.

Fréquents (1 à 10 % des patients) : diminution de l'appétit, douleur abdominale, constipation, bouche sèche, nausées, vomissements, ballonnement, perte de poids, syndrome grippal, sensation de malaise, douleur de la nuque, angine de poitrine, hypotension orthostatique, chute, douleurs articulaires ou musculaires, engourdissement de la main, rêves anormaux, trouble de la coordination des mouvements, dépression, vertiges, rhume, éruption cutanée, yeux rouges, besoin fréquent d'uriner, anomalie de la numération formule sanguine (diminution des globules blancs).

Peu fréquents (moins de 1 % des patients) : accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, éruption cutanée bulleuse.

Des troubles graves du comportement ont été rapportés : addiction aux jeux d'argent, consommation excessive de nourriture, achats compulsifs, hypersexualité (voir Attention).

Ce médicament renforce l'activité de la lévodopa ; il peut aussi en augmenter les effets indésirables, notamment le risque d'hypotension orthostatique.

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en ligne.

Laboratoire Téva Santé