

	Antidépresseurs tricycliques	Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS)	Autres antidépresseurs		
			Inhibiteurs de la monoamine oxydase-A (phénelzine, isocarboxazide, tranylcypromine)	Moclobémide	Venlafaxine et duloxétine
Mises en garde et précautions d'emploi	Leur utilisation est limitée par le risque d'effets indésirables : hypotension orthostatique, troubles psychiques (confusion, hallucinations) Ils doivent uniquement être utilisés avec prudence Éviter les antidépresseurs tricycliques chez les personnes atteintes d'hypotension orthostatique, de chutes ou de démence	Ils peuvent aggraver les symptômes moteurs, mais cela se produit rarement	Aucune recommandation sur leur utilisation chez les PcP ne peut être formulée		
Utilisation déconseillée	La sélégiline ne doit pas être administrée avec des antidépresseurs quels qu'ils soient				
		L'association de rasagiline et de fluoxétine ou de fluvoxamine doit être évitée Un intervalle libre d'au moins 5 semaines doit être respecté entre l'interruption de la fluoxétine et le début d'un traitement par la rasagiline. Un intervalle libre d'au moins 14 jours doit être respecté entre l'interruption de la rasagiline et le début d'un traitement par la fluoxétine ou la fluvoxamine	Ne doivent pas être utilisés avec la lévodopa, l'entacapone ou la tolcapone		
Utilisation prudente	Chez les personnes traitées par entacapone ou tolcapone		Chez les personnes traitées par entacapone ou tolcapone		
			Chez les personnes traitées par lévodopa		