

découvrir des signes suspects (par exemple un grain de beauté ayant une bordure irrégulière ou une couleur qui change).



La rasagiline peut provoquer une somnolence pendant la journée et un endormissement au cours des activités quotidiennes, en particulier si vous prenez d'autres médicaments dopaminergiques. La conduite automobile et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées pendant le traitement. Elles sont contre-indiquées chez les personnes ayant eu une envie impérieuse de dormir sous traitement.

## Interactions du médicament AZILECT avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé avec les autres IMAO, les antalgiques contenant de la péthidine et les produits de phytothérapie contenant du millepertuis : il convient de respecter un délai d'au moins 14 jours entre l'arrêt de la rasagiline et le début d'un traitement avec l'un de ces médicaments.

Il peut interagir avec les vasoconstricteurs décongestionnants utilisés dans le traitement du rhume (par voie orale ou nasale) et les médicaments contenant du dextrométhorphan, de la fluvoxamine, de la flouxétine ou de la ciprofloxacine.

Lors de l'arrêt du tabagisme, l'effet de ce médicament peut être renforcé ; informez votre médecin ou votre pharmacien si vous fumez ou si vous avez l'intention d'arrêter de fumer.

## Fertilité, grossesse et allaitement

### Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

### Allaitement :

Ce médicament peut inhiber la lactation.

## Mode d'emploi et posologie du médicament AZILECT

Ce médicament peut être pris au cours ou en dehors des repas.

### Posologie usuelle :

\_ Adulte de plus de 18 ans : 1 comprimé par jour.

## Conseils

Prenez contact avec les associations destinées aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson : elles diffusent une information utile sur l'évolution de la maladie et sur ses traitements.

Le maintien d'une activité physique régulière est recommandé.

## Effets indésirables possibles du médicament AZILECT

Très fréquents (plus de 10 % des patients) : mouvements anormaux, maux de tête.

Fréquents (1 à 10 % des patients) : diminution de l'appétit, douleur abdominale, constipation, bouche sèche, nausées, vomissements, ballonnement, perte de poids, syndrome grippal, sensation de malaise, douleur de la nuque, angine de poitrine, hypotension orthostatique, chute, douleurs articulaires ou musculaires, engourdissement de la main, rêves anormaux, trouble de la coordination des mouvements, dépression, vertiges, rhume, éruption cutanée, yeux rouges, besoin fréquent d'uriner, anomalie de la numération formule sanguine (diminution des globules blancs).

Peu fréquents (moins de 1 % des patients) : accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, éruption cutanée bulleuse.

Des troubles graves du comportement ont été rapportés : addiction aux jeux d'argent, consommation excessive de nourriture, achats compulsifs, hypersexualité (voir Attention).

Ce médicament renforce l'activité de la lévodopa ; il peut aussi en augmenter les effets indésirables, notamment le risque d'hypotension orthostatique.

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d'être dû à ce médicament, vous pouvez le déclarer en ligne.

**Laboratoire Téva Santé**